

Осторожно, клещи!

С наступлением весны «просыпаются» клещи и активно нападают на население. Уже 14.03.2016г. был зарегистрирован первый укус клеща. На 20.05.2016г. от клещей пострадало 445 человек.

В эпидсезон с апреля по декабрь 2015 года в учреждения здравоохранения с укусами клещей обратилось 2518 человек. За 2015 год было зарегистрировано 48 случаев заболеваемости Лайм-боррелиозом (в 2014г. – 31 сл.). При проведении эпидрасследования установлено, что 62% заболевших Лайм-боррелиозом не обращались за медпомощью и не принимали профилактическое лечение.

В 2015 году осень и начало зимы выдалась теплыми, поэтому последние клещи, которые нападали на людей были зарегистрированы в 3-ей декаде декабря (29.12.15г. и 30.12.15г.).

Иксодовые клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний. Наиболее часто среди людей регистрируются случаи заболевания Лайм-боррелиозом и клещевым энцефалитом. Также среди популяции иксодовых клещей на территории республики отмечена циркуляция возбудителей других инфекций: анаплазмоз, эрлихиоз, риккетсиоз, бабезиоз и др..

Заболеть клещевыми инфекциями можно:

- при присасывании к кожным покровам человека клеща, зараженного возбудителем (вирус, боррелия);
- при раздавливании зараженного клеща и попадании возбудителя в поврежденную кожу или слизистые (царапины, ссадины);
- при инфицировании плода через плаценту беременной женщины;
- при употреблении в пищу некипяченого молока и термически необработанных молочных продуктов собственного изготовления.

Профилактика клещевых инфекций:

- чтобы уберечь себя от нападения клеща, необходимо выходить в лес в одежде, сводящей до минимума наличие открытых участков тела;
- при возвращении домой после осмотра одежду необходимо сменить и вывесить на воздух для проветривания, по возможности прогладить горячим утюгом. Эффективность защитных свойств одежды значительно повышается при ее обработке реппелентами (ДЭТА, Рэдет, Тайга, Пермет и др.);
- при удалении клещей у животных (собаки, коты) необходимо использовать защитные средства (резиновые перчатки);
- в пищу употреблять только кипяченое молоко и его продукты. Вирус клещевого энцефалита погибает при кипячении молока через 2 минуты.

Если клещ присосался к телу, для удаления его необходимо обратиться в территориальное учреждение по месту жительства к хирургу. В выходные, праздничные дни, вечернее время для взрослого населения оказывает медпомощь по удалению клещей травмопункт УЗ «Могилевская центральная поликлиника», детям – травмопункт УЗ «Могилевская областная детская больница».

Лица, подвергшиеся нападению клеща, должны в обязательном порядке обратиться в поликлинику по месту жительства к инфекционисту или участковому терапевту, который назначит профилактическое лечение и наблюдение.

По вопросам консультаций профилактики клещевых инфекций можно обратиться в УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по телефону 237477.