

Профилактика микроспории

Ежегодно среди населения города Могилева и Могилевского района регистрируются случаи заболевания микроспорией. Так, за текущий 2020 год (на 24.12.2020) было зарегистрировано 80 случаев микроспории, из них дети до 17 лет составили 99% (79 детей).

Заболевание имеет сезонность, регистрация возрастает в осенне-зимний период. В 85% заражение детей происходит после контакта с кошками, которые являются основными носителями микозов. У животного частицы грибкового возбудителя находятся на шерсти и усах. Преобладает прямой путь инфицирования, когда грибок попадает на кожу пациента в ходе непосредственного контакта с кошачьей шерстью. Реже бывает непрямой путь, когда ребенок прикасается к предметам, загрязненным частицами микроспор.

Носителями инфекции могут быть не только бродячие кошки, как принято считать в обществе, но и представители элитных пород. Кроме того, ребенок может получить «стригущий лишай» после контактов с собаками, кроликами, обезьянами, реже — с зараженными детьми в инкубационном периоде.

От момента заражения до появления первых признаков болезни проходит обычно 5-10 дней.

Клинические проявления грибкового заболевания определяются локализацией процесса. При поражении гладкой кожи - на теле появляются розовые пятна округлой формы, которые имеют четкие края и размер до 2-3 см. При поражении волосистой части - волосы обламываются на высоте 4-6 мм, из-за чего болезнь и получила неофициальное название «стригущий лишай».

Микроспория относится к эпидемиологически значимым заболеваниям, поэтому при выявлении заболевания у организованных детей, они отстраняются от посещения школы. Длительность изоляции составляет до 45 дней — максимальный период инкубации болезни

Чтобы предупредить заболевание микроспорией необходимо:

- исключить контакт (детей) с безнадзорными животными, не брать их домой;
- необходимо населению соблюдать санитарно-гигиенические правила: пользоваться только индивидуальной расческой, головным убором, постельным бельем и другими предметами личного назначения;
- взятых в дом котят, щенков следует осмотреть ветеринарным врачом;
- домашних питомцев привить против микроспории;
- больных (с подозрением) животных нельзя выбрасывать на улицу, их следует обследовать в ветлечебнице для установления диагноза и назначения лечения!

Энтомолог УЗ «МЗЦЭ» Н.Г.Матвеевко