

«Организация противогриппозных мероприятий в учреждениях образования»

Грипп – острая инфекционная болезнь, проявляющаяся повышением температуры, ознобом, ломотой в суставах, головной болью, носовыми кровотечениями. **Опасен грипп своими осложнениями.** Источником инфекции является больной человек, который опасен для окружающих с первого дня болезни, даже в легкой форме.

С целью профилактики возникновения и распространения гриппа в учреждениях образования необходимо выполнение целого комплекса организационно-профилактических и оздоровительных мероприятий.



В предэпидемический период.

- ❖ В каждом учреждении необходимо разработать и утвердить план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в т.ч. в предэпидемический период и на период эпидемии, назначить приказом ответственного из числа администрации за организацию и проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в соответствии с разработанными планами профилактики гриппа и ОРВИ.
- ❖ Неукоснительно соблюдать требования санитарных норм и правил по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.
- ❖ Обеспечить соблюдение температурного режима и режима проветривания. Вести контроль за температурой воздуха в помещениях.
- ❖ Обеспечить учреждение достаточным запасом моющих и дезинфицирующих средств.
- ❖ Обеспечить бесперебойное функционирование изоляторов в учебно-воспитательных учреждениях.
- ❖ Создать запас 4-х слойных марлевых (одноразовых) масок для персонала.
- ❖ Обеспечить в детских дошкольных учреждениях и школах проведение ежедневной витаминизации 1-х и 3-х блюд в количестве 40 мг аскорбиновой кислоты для детей 1-5 лет и 50 мг – для детей 6-7 лет в зимне-весенний период, организовать в детских дошкольных учреждениях прием сиропа из плодов шиповника по 1 ч.л. в день или отвара шиповника по 200г. в день - с ноября по март месяц.
- ❖ Организовать в детских дошкольных учреждениях профилактическое УФ облучение детей с 25.10. по 01.12.2009 г. через день.
- ❖ Приобрести средства экстренной профилактики для персонала (ремантадин, интерферон, оксалиновая мазь) и препараты для повышения резистентности организма детей (витаминные комплексы, фитонциды, отвары трав).
 - ❖ Активизировать санитарно-просветительную работу (санбюллетени, памятки, беседы с родителями и т.д.) по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа.
 - ❖ Обеспечить раннее выявление больных силами воспитателей, преподавателей, санитарных постов и изоляцию заболевших детей и персонала.
 - ❖ Обеспечить проведение иммунизации против гриппа работников учреждений до 01.12.2009г.

В период эпидемии гриппа и ОРВИ.

В детских дошкольных учреждениях.

- ❖ Организовать ежедневную термометрию детей в детских садах. В ясельных группах, кроме того, организовать ежедневный осмотр слизистой носоглотки детей с измерением температуры тела силами воспитателей.
- ❖ Больных детей, выявленных на приеме, не допускать в коллектив, а выявленных в течение дня помещать в изолятор до прихода родителей.
- ❖ При возникновении в группе 3-5 случаев ОРВИ, связанных между собой или с общим источником, на группу накладывается карантин на 14 дней после регистрации последнего случая заболевания.
- ❖ В период карантина запрещается перевод из группы в группу и прием вновь поступающих детей.
- ❖ Персонал карантинных групп должен работать в 4-х слойных марлевых масках, которые необходимо менять каждые 3-4 часа.
- ❖ При появлении признаков ОРВИ персонал отстраняется от работы по непосредственному обслуживанию детей.
- ❖ Организовать:
 - сквозное проветривание помещений в отсутствие детей,
 - влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств в конце дня в отсутствие детей,
 - дезинфекцию посуды и игрушек в конце дня в отсутствие детей в режиме, установленном действующими нормативными документами,
 - обеззараживание воздушной среды помещений с помощью бактерицидных ламп в отсутствие детей в течение 20-30 минут с последующим проветриванием,
 - удлинение времени пребывания детей на свежем воздухе до 4-х часов в день в соответствующей одежде.
- ❖ Для повышения резистентности организм организовать поливитаминизацию рационов питания.

В школах.

- ❖ При регистрации очага с 3-5 и более случаями ОРВИ в классе, проводят карантинные мероприятия в течение 14 дней после выявления последнего случая заболевания.
- ❖ Обеспечить раннее выявление больных силами воспитателей, преподавателей, санитарных постов.
- ❖ Заболевших в школе отправлять домой для лечения.
- ❖ Запрещается проведение массовых мероприятий в помещениях школ на время эпидемии.
- ❖ Необходимо ежедневное проведение влажной уборки классов силами технического персонала с применением зарегистрированных в РБ, а дезинфицирующих средств, а также регулярное проветривание классов.