

# Профилактика коклюша в организованных коллективах

**Коклюшная инфекция передается воздушно-капельным путём при близком контакте. Возможность заражения коклюшем увеличивается при нахождении вместе с заболевшим в закрытом помещении – дома, в группе детского сада, в школе.**



**Для коклюшной инфекции характерен постепенно нарастающий кашель. В начале заболевания кашель редкий, может быть с насморком и невысокой температурой. Через 2-3 недели кашель становится приступообразным, с преобладанием в ночное время, с выделением слизи, рвотой после приступа.**

**В начале заболевания отличить коклюш от острой респираторной инфекции трудно, но в этот период заболевший опасен для окружающих. Поэтому родители кашляющих детей должны знать, что, если ребёнок начал кашлять и кашель усиливается с каждым днём, его лучше оставить дома и вызвать врача.**

**Визит с кашляющим ребёнком в детскую поликлинику, также, как и в организованном коллективе, опасен для других пациентов, особенно для маленьких, не привитых против коклюша детей.**

**Не должны быть безразличны к кашляющим детям преподаватели школ и воспитатели детских садов. Если вы услышали у ребёнка кашель, отправьте его к врачу для выяснения причин кашля и лечения.**

**Важным средством защиты от массового распространения коклюша являются прививки, которые проводятся в возрасте до 3-х лет. Иногда привитой ребёнок при длительном контакте с заболевшим коклюшем также может заболеть, при этом заболевание протекает в лёгкой форме, без осложнений. У непривитых детей на фоне приступа кашля может возникнуть остановка дыхания, нарушение функций головного мозга, сопровождающееся судорогами, высокая опасность пневмоний.**



**Необходимо помнить, что у ребёнка с проявлениями кашля нужно исключить коклюшную инфекцию, при этом ребёнок должен быть своевременно изолирован и осмотрен врачом!**

Кашляющий ребёнок опасен для окружающих!